

521, 805

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



21 JAN 2005



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
5. Februar 2004 (05.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/011004 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61K 31/495**,
9/127, A61P 35/00, C07D 295/18

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008011

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Juli 2003 (22.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 33 632.6 24. Juli 2002 (24.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **WILEX AG** [DE/DE]; Grillparzerstrasse 10, 81675
München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **WOSIKOWSKI-
BUTERS, Katja** [DE/DE]; Seerosenstr. 3, 85586 Poing
(DE). **SCHMALIX, Wolfgang** [DE/DE]; Beislerstr. 45,
82194 Gröbenzell (DE).

(74) Anwalt: **WEICKMANN & WEICKMANN**; Postfach
860 820, 81635 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG,
CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*


*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.*

(54) Title: FORMULATION OF LIPOSOMAL DERIVATIVES OF PHENYLALANINE

(54) Bezeichnung: LIPOSOMALE FORMULIERUNGEN VON PHENYLALANIN-DERIVATEN

(57) Abstract: The invention relates to formulation of liposomal derivatives of phenylalanine and the use thereof as inhibitors of urokinase, in particular for treating malignant tumours and tumoral metastasis.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft pharmazeutische Formulierungen von Phenylalanin-Derivaten und deren Verwendung als Urokinase-Inhibitoren, insbesondere zur Behandlung von malignen Tumoren und von Tumormetastasen.



WO 2004/011004 A1

LIPOSOMALE FORMULIERUNGEN VON PHENYLALANIN-DERIVATEN

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft pharmazeutische Formulierungen von Phenylalanin-Derivaten und deren Verwendung als Urokinase-Inhibitoren, insbesondere zur Behandlung von malignen Tumoren und von Tumormetastasen.

10 Die Fähigkeit solider Tumoren zur Ausbreitung und Metastasierung in umgebendes Gewebe korreliert mit dem Abbau bzw. Umbau der extrazellulären Matrix (Tumorstroma) in der Umgebung der Tumorzelle bzw. mit deren Fähigkeit zur Durchdringung der Basalmembran. Obwohl die (patho)biochemischen Zusammenhänge noch nicht endgültig aufgeklärt
15 sind, kommen dem Plasminogenaktivator Urokinase (uPA) und dem Urokinaserezeptor (uPAR) eine zentrale Bedeutung zu. uPA vermittelt die proteolytische Spaltung von Plasminogen zu Plasmin. Plasmin wiederum ist eine Protease mit breitem Wirkspektrum, die Komponenten der extrazellulären Matrix wie Fibrin, Fibronectin, Laminin und das
20 Proteingerüst der Proteoglykane direkt abzubauen vermag. Außerdem kann Plasmin "latente" Metalloproteasen und das inaktive Proenzym von uPA, pro-uPA, aktivieren.

Tumorzellen und nichtmaligne Zellen des Tumorstromas synthetisieren und
25 sezernieren das enzymatisch inaktive Proenzym pro-uPA. Proteasen, wie z.B. Plasmin oder die Kathepsine B und L, spalten pro-uPA durch limitierte Proteolyse zur aktiven Serinprotease HMW-uPA (HMW = high molecular weight). pro-uPA und die aktive Protease HMW-uPA binden an den Zelloberflächenrezeptor uPAR (CD87). Plasmin(ogen) bindet ebenfalls an
30 spezifische Rezeptoren auf der Plasmamembran der Tumorzelle, wodurch eine Fokussierung und Amplifikation der Plasminogenaktivierung in der direkten Umgebung der Tumorzelle erreicht wird. Invasiven Zellen ist somit

die Möglichkeit gegeben, die extrazelluläre Matrix abzubauen, ohne sich der für eine gerichtete Bewegung notwendigen Unterlagen durch Proteolyse zu entziehen.

5 In verschiedenen zellbiologischen Studien konnte gezeigt werden, dass dem zellassoziierten Plasminogenaktivator-System innerhalb der kaskadenartigen Reaktionswege tumorassoziiierter Proteolysesysteme ein besonderer Stellenwert zukommt (Wilhelm et al. (1994) The Urokinase/Urokinase receptor system: A new target for cancer therapy? In: Schmitt M., Graeff
10 H., Kindermann G. (Hrsg): Prospects in Diagnosis and Treatment of Cancer. International Congress Series, Excerpta Medica 1050, Amsterdam, Elsevier 1994, pp145-156). An Kulturen humaner Kolonkarzinomzellen wurde beobachtet, dass deren Fähigkeit, eine extrazelluläre Matrix zu durchwandern, vom Sättigungsgrad der uPA-Rezeptoren mit aktivem uPA
15 abhängig ist (Hollas et al., Cancer Res. 51 (1991), 3690-3695). Ebenfalls im Zellkulturmodell wurde eine Reduktion des invasiven Potenzials von Zellen beobachtet, wenn die proteolytische Aktivität von uPA durch PAI-1 (Cajot et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87 (1990), 6939-6943) oder PAI-2 (Baker et al., Cancer Res. 50 (1990), 4676-4684) gehemmt wurde. Ein
20 vergleichbarer Effekt wurde bei Hemmung der Bindung von uPA an die Zelloberfläche durch Blockierung des Rezeptors mittels proteolytisch inaktiver uPA-Varianten erzielt (Cohen et al., Blood 78 (1991), 479-487; Kobayashi et al., Br. J. Cancer 67 (1993), 537-544). Auch die Transfektion epidermoider Karzinomzellen mit einem Plasmid, das ein
25 Antisense-Transkript gegen einen Teil von uPAR exprimiert, führte durch Unterdrückung der uPAR-Synthese zur Verringerung der Invasivität dieser Zellen (Kook, EMBO J. 13 (1994), 3983-3991). Gegen uPA und PAI-1 gerichtete Antikörper reduzierten das invasive Potential von Lungenkrebszellen *in vitro* (Liu et al., Int. J. Cancer 60 (1995), 501-506).

30

Der Einfluss des Plasminogenaktivator-Systems auf den Metastasierungsprozess konnte auch in Tumor-Tiermodellen belegt werden.

So wurden die durch menschliche Karzinomzellen verursachte Bildung von Lungenmetastasen in Hühnerembryos durch Zugabe von Antikörpern gegen uPA fast vollständig verhindert (Ossowski und Reich, Cell 35 (1983), 611-619). Metastasierende menschliche Karzinomzellen wurden mit einem Expressionsplasmid transfiziert, das für eine proteolytisch inaktive, aber uPAR-bindende uPA-Mutante kodierte. Im Mausmodell zeigte sich, dass die Karzinomzellen, die inaktives uPA synthetisierten, nach Injektion im Vergleich zu den nichttransfizierten Zellen eine signifikant geringere Anzahl an Metastasen bildeten (Crowley et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90 (1993), 5021-5025). Nach Verabreichung von uPA-Antisense Oligonukleotiden wurde darüber hinaus eine Inhibierung der intraperitonealen Ausbreitung von humanen Ovarialkarzinomzellen in Nacktmäusen beobachtet (Wilhelm et al., Clin. Exp. Metast. 13 (1995), 296-302).

In den letzten Jahren wurde die klinische Relevanz von Faktoren des Plasminogenaktivator-Systems (uPA, uPAR, PAI-1 und PAI-2) für die Prognose von Patienten mit soliden malignen Tumoren intensiv untersucht. Dabei erwies sich der uPA-Antigengehalt bei verschiedenen Tumoren (z.B. Brust, Eierstock, Magen, Lunge, Niere etc.) sowohl für das rezidivfreie Überleben als auch für das Versterben als ein starker Prognosefaktor (siehe beispielsweise Schmitt et al., J. Obstet. Gynaecol. 21 (1995), 151-165; Jaenicke et al., Breast Cancer Res. Treat. 24 (1993), 195-208; Kuhn et al., Gynecol. Oncol. 55 (1994), 401-409; Nekarda et al., Lancet 343 (1994), 117; Pedersen et al., Cancer Res. 54 (1994), 4671-4675). Ebenso korrelieren erhöhte Konzentrationen an uPAR in Lungen- (Pedersen et al., supra) und Brustkrebsgewebe (Duggan et al., Int. J. Cancer 61 (1995), 597-600; Ronne et al., Breast Cancer Res. Treat. 33 (1995), 199-207) sowie bei Magenkrebs, sowohl im Tumorgewebe selbst (Heiss et al., J. Clin. Oncol. 13 (1995), 2084-2093) als auch bei den ins Knochenmark ausgestreuten Tumorzellen (Heiss et al., Nature Medicine 1 (1995), 1035-1039) mit einer schlechten Prognose.

Es wurde auch gefunden, dass an Position 2 mit einem Phenylrest substituierte 3-Amidinophenylalanin-Derivate selektive und *in vivo* wirksame Hemmstoffe von uPA darstellen (PCT/EP99/05145). Die Verabreichung dieser Verbindungen im Tierexperiment erfolgt in Form von wässrigen Lösungen. DE 102 25 876.7 offenbart die Verwendung von 3-Guanidinophenylalanin-Derivaten als Urokinase-Inhibitoren.

Im Rahmen der ersten klinischen Erprobungen der oben genannten Verbindungen hat sich gezeigt, dass die Verabreichung in Form von wässrigen Lösungen mit Nachteilen behaftet ist. So wurde festgestellt, dass die Verbindungen in höher konzentrierten Lösungen bei intravenöser Injektion oder Infusion hämolytische Eigenschaften besitzen und bei subkutaner Verabreichung zu Hautreizungen führen. Zur Verabreichung von gering konzentrierten Lösungen werden jedoch große Infusionsvolumina benötigt und eine subkutane Verabreichung wirksamer Mengen des Mittels in Form wässriger Lösungen ist nicht möglich.

Es bestand daher das Bedürfnis, neue pharmazeutische Formulierungen der Phenylalanin-Derivate zu entwickeln, die einerseits stabil sind und eine hohe Wirksamkeit besitzen, aber andererseits nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen, wie Hämolyse oder Hautreizungen, führen.


Versuche zur Stabilisierung von wässrigen Lösungen durch Zusatz oberflächenaktiver Mittel, wie etwa Pluronic F68 oder Tween 80, bzw. Stabilisatoren, wie Humanserumalbumin, waren jedoch erfolglos. Auch der Zusatz von Cosolventien, wie Polyethylenglycolen, führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Schließlich konnte auch durch Formulierung des Wirkstoffs in gemischten Micellen, die das Gallensalz Glycocholatmonohdyrat und das Phospholipid Ei-Phosphatidylcholin enthielten, nicht für eine ausreichende Stabilität gesorgt werden.

- 5 -

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe bestand somit darin, pharmazeutische Formulierungen mit einem von 3-Amidinophenylalanin bzw. 3-Guanidinophenylalanin abgeleiteten Urokinase-Inhibitor bereitzustellen, die einerseits eine hohe Wirksamkeit besitzen und
 5 andererseits stabil und verträglich sind.

Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung von 3-Amidinophenylalanin oder 3-Guanidinophenylalanin abgeleitete neue Urokinase-Inhibitoren der allgemeinen Formel I,

10



15

20

die als Racemate sowie als L- bzw. D-konfigurierte Verbindungen vorliegen und in denen

X eine Amidino- oder Guanidinogruppe ist,

25

R1 (a) OH oder OR⁴ ist, wobei R⁴ ein gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituiertes, verzweigtes oder unverzweigtes C₁-C₈-Alkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl oder Aralkyl, z.B. Benzyl oder
 30 Phenylethyl ist,

30


- 6 -

(b) eine Gruppe der Formel $\begin{array}{c} \text{R}^5 \\ \diagup \\ \text{-N} \\ \diagdown \\ \text{R}^6 \end{array}$ darstellt, in welcher R^5 und

R^6 beliebige mit der Gesamtstruktur kompatible Reste sind, wobei insbesondere

- (i) R^5 und R^6 H sind,
- (ii) R^5 H ist und R^6 ein gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituiertes verzweigtes oder unverzweigtes C_1 - C_8 -Alkyl, Aralkyl, z.B. Benzyl oder Phenylethyl, oder C_5 - C_8 Cycloalkyl ist,
- (iii) R^5 und R^6 jeweils unabhängig ein gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl oder/und Halogen substituiertes, unverzweigtes oder verzweigtes C_1 - C_4 Alkyl sind oder
- (iv) R^5 H ist und R^6 $-\text{NH}_2$ oder eine insbesondere mit Aryl oder Heteroaryl substituierte Aminogruppe ist,
- (v) R^5 H oder ein gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl oder/und Halogen substituiertes, unverzweigtes oder verzweigtes C_1 - C_4 Alkyl ist und R^6 der Rest einer Aminosäure, z.B. einer α -, β - oder ω -Aminocarbon- oder Aminosulfonsäure, oder der Rest eines Peptids z.B. mit einer Länge bis zu 50 Aminosäuren oder eines Polypeptids z.B. mit einer Länge von mehr als 50 Aminosäuren bis 1.000 Aminosäuren ist,


(c) eine Gruppe der Formel



- 7 -

darstellt, in welcher m die Zahl 1 oder 2 bezeichnet, und in welcher eine oder mehrere der Methylengruppen gegebenenfalls z.B. mit einem Hydroxyl-, Carboxyl-, C₁-C₄-Alkyl- oder Aralkylrest, z.B. Benzyl oder Phenylethyl, substituiert sind, wobei die Gruppe (c) racemisch oder D- bzw. L-konfiguriert ist, und R⁷ die Bedeutung von R¹ in den Ziffern (a), (b) und (f) aufweist,


(d) eine Gruppe der Formel



darstellt, in welcher p = r = 1, p = 1 und r = 2 oder p = 2 und r = 1 sind und in welcher eine oder mehrere der Methylengruppen gegebenenfalls z.B. mit einem Hydroxyl-, Carboxyl-, C₁-C₄-Alkyl- oder Aralkylrest, z.B. Benzyl oder Phenylethyl, substituiert sind, und R⁷ die Bedeutung von R¹ in Ziffer (a), (b) und (f) aufweist,

(e) eine Piperidylgruppe darstellt, die gegebenenfalls in einer der Stellungen 2, 3 und 4 z.B. mit einem C₁-C₄-Alkyl-, C₁-C₃-Alkoxy- oder Hydroxylrest substituiert ist, wobei gegebenenfalls an die heterocycloaliphatischen Ringe der Formeln (c), (d), (e) ein weiterer aromatischer oder cycloaliphatischer Ring, vorzugsweise Phenyl oder Cyclohexyl, in 2,3 oder 3,4 Stellung, bezogen auf das Heteroatom, ankondensiert ist,

(f) eine Gruppe der Formel



5

darstellt, in welcher R^8

10

- (i) einen gegebenenfalls z.B. mit C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkoxy, Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituierten C_1 - C_6 -Alkylrest, wie z.B. Ethoxycarbonyl, oder Arylrest, wie z.B. Phenyl, p-Halogenphenyl, Naphthyl,
- (ii) einen gesättigten oder ungesättigten, verzweigten oder unverzweigten C_1 - C_6 -Alkoxyrest oder
- (iii) einen gegebenenfalls z.B. mit C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkoxy, Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituierten Phenoxy- bzw. Benzyloxycarbonylrest bedeutet,

15

(g) einen Acylrest der Formel -COX darstellt, wobei X

20

- (i) H, einen gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituierten, unverzweigten oder verzweigten Alkylrest, vorzugsweise einen C_1 - C_6 -Alkylrest, insbesondere Methyl,
- (ii) einen gegebenenfalls z.B. mit C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkoxy, Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituierten Aryl- oder Heteroarylrest, wie z.B. Phenyl, p-Halogenphenyl, Thienyl oder
- (iii) einen gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituierten Cycloalkylrest, vorzugsweise einen C_3 - C_{10} -Cycloalkylrest bedeutet,

25

30

- (h) einen Aralkylrest, z.B. Benzyl oder Phenylethyl, darstellt, in dem der aromatische Rest gegebenenfalls z.B. mit einem Halogenatom, einer C₁-C₆-Alkyl-, C₁-C₃-Alkoxy-, Hydroxy-, Cyano-, Carboxyl-, Sulfonyl- oder Nitrogruppe substituiert ist,
- (i) einen Carbonsäureamidrest der Formel -CONR'R", einen Thiocarbonsäureamidrest -CSNR'R" oder einen Essigsäureamidrest -CH₂-CONR'R" darstellt, wobei
- (i) R' und R" H sind,
 - (ii) R' und R" jeweils unabhängig C₁-C₄-Alkyl sind,
 - (iii) R' H ist und R" C₁-C₄-Alkyl ist,
 - (iv) R' H ist und R" Aryl, z.B. Phenyl, ist oder
 - (v) R' und R" mit dem Stickstoffatom einen heterocycloaliphatischen Ring mit 5-7 Ringgliedern, der ein weiteres Heteroatom, z.B. N, O oder/und S tragen kann, bilden,
- (j) einen SO₂-Y-Rest darstellt, in dem Y
- (i) ein gegebenenfalls z.B. mit Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituiertes C₁-C₈-Alkyl, vorzugsweise Methyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl,
 - (ii) ein gegebenenfalls z.B. mit C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₃-Alkoxy, Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituiertes Aryl oder Heteroaryl, wie z.B. Phenyl, 4-Methyl-phenyl, 2,4,6-Trimethyl-phenyl, 2,4,6-Triisopropyl-phenyl, 4-Methoxy-2,3,6-Trimethyl-phenyl, 2,2-Dimethyl-6-methoxy-chromanyl, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromanyl, Anthrachinonyl, Naphthyl oder Chinolyl, bzw. O-Aryl, vorzugsweise O-Phenyl, oder O-Heteroaryl oder

(iii) $-NR'R''$ ist, wobei R' und R'' jeweils unabhängig H oder C_1 - C_3 -Alkyl bedeuten,

5 (k) einen cycloaliphatischen Ring mit 5 bis 8 C-Atomen darstellt, der gegebenenfalls z.B. mit einer C_1 - C_6 -Alkyl-, C_1 - C_3 -Alkoxy-, Halogen-, Hydroxyl- oder/und Oxogruppe substituiert ist,

10 (l) einen gegebenenfalls z.B. mit C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkoxy, Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen substituierten Heteroarylrest, wie z.B. Pyridyl oder Pyrimidyl, oder heterocycloaliphatischen Rest, beispielsweise N-Methylpiperidyl darstellt,

15 (m) einen funktionalisierten Alkylrest der Formel $-(CH_2)_n-X$ darstellt, wobei die Alkylkette unverzweigt oder verzweigt ist, $n = 1$ bis 8 bedeutet und der funktionelle Rest X

20 (i) eine Hydroxylgruppe darstellt, deren H-Atom gegebenenfalls durch eine C_1 - C_4 -Alkyl-, Aralkyl-, z.B. Benzyl oder Phenylethyl, Aryl-, z.B. Phenyl, C_1 - C_4 -Hydroxyalkyl- oder Acylgruppe CO-Alkyl, (C_1 - C_6), substituiert ist,

(ii) ein Halogenatom bedeutet,

25 (iii) eine tertiäre Aminogruppe der Formel $-N(Alk)_2$ darstellt, wobei die Alkylgruppen 1 bis 3 C-Atome sowie vorzugsweise die gleiche Bedeutung besitzen und das Stickstoffatom gegebenenfalls einem heterocycloaliphatischen Ring mit 5-7 Ringgliedern, der ein weiteres Heteroatom, z.B. N, O oder/und S tragen kann, angehört,

30 R^2 einen gegebenenfalls z.B. mit C_1 - C_6 -Alkyl, C_1 - C_3 -Alkoxy, Hydroxyl, Carboxyl, Sulfonyl, Nitro, Cyano, Oxo oder/und Halogen

substituierten Phenylrest, wie beispielsweise Phenyl, 4-Methylphenyl, 2,4,6-Trimethyl-phenyl, 2,4,6-Triisopropyl-phenyl, 4-Methoxy-2,3,6-trimethyl-phenyl darstellt,

5 R^3 H oder verzweigtes bzw. unverzweigtes C_1 - C_4 -Alkyl ist und n 0 oder 1 bedeutet,

 Z N oder CR^9 bedeutet, wobei R^9 H oder verzweigtes oder unverzweigtes C_1 - C_4 -Alkyl ist.

10

Die Verbindungen können auch als Salze, vorzugsweise als physiologisch verträgliche Säuresalze, z.B. als Salze von Mineralsäuren, besonders bevorzugt als Hydrochloride, oder als Salze von geeigneten organischen Säuren vorliegen.

15

Von den in den allgemeinen Ansprüchen definierten Verbindungen sind solche, bei denen R^1 einer Gruppe der Formeln (b), (d) und (f) entspricht, R^2 einen einfach, zweifach oder dreifach alkylsubstituierten Phenylrest, insbesondere einen 2,4,6-substituierten Phenylrest, z.B. einen 2,4,6-Triisopropylphenyl-Rest darstellt, und $n = 0$ ist, von besonderer
20 Bedeutung. Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen, bei denen Z CH oder N ist.

25

Besonders bevorzugt handelt es sich bei der Verbindung der Formel (I) um $N\alpha$ -(2,4,6-Triisopropyl-phenylsulfonyl)-3-amidino-(D,L)-phenylalanin-4-ethoxycarbonyl-piperazid, $N\alpha$ -(2,4,6-Triisopropyl-phenylsulfonyl)-3-guanidino-(D,L)-phenylalanin-4-ethoxycarbonyl-piperazid bzw. um das L-Entantiomere davon oder um ein pharmazeutisch verträgliches Salz dieser Verbindungen.

30

Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind in der Lage, hocheffizient das Wachstum oder/und die Ausbreitung von malignen Tumoren zu hemmen,

- z.B. die Tumorausbreitung beim Pankreaskarzinom, das Tumorwachstum des Mammakarzinoms sowie die Metastasierung von Tumoren. Dabei können die uPA-Inhibitoren gegebenenfalls zusammen mit anderen Antitumormitteln oder mit anderen Behandlungsarten, z.B. Bestrahlung oder chirurgischen Eingriffen, eingesetzt werden. Weiterhin sind die erfindungsgemäßen Inhibitoren auch für andere uPA-assoziierte Erkrankungen wirksam (z.B. bei der Verhinderung der Blasenbildung bei der Hauterkrankung Pemphigus vulgaris).
- Die erfindungsgemäßen liposomalen Formulierungen enthalten den Wirkstoff vorzugsweise in einem Gewichtsanteil von 0,5-10 %, besonders bevorzugt von 2-5 %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung. Weiterhin ist bevorzugt, dass die Formulierung - zumindest deren wässrige Komponente - einen pH-Wert im Bereich von 5,5-9,0 aufweist. Der Gehalt an freiem, d.h. nach Abfiltration von Lipidkomponenten in der wässrigen Phase der Formulierung vorliegendem Wirkstoff, ist vorzugsweise ≤ 1 mg/ml, besonders bevorzugt $\leq 500 \mu\text{g/ml}$ und am meisten bevorzugt $\leq 100 \mu\text{g/ml}$.
- Die Formulierung enthält vorzugsweise Phospholipide in einem Gewichtsanteil von 4,5-40 %, besonders bevorzugt von 6-15 %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung. Beispiele für geeignete Phospholipide sind neutrale Phospholipide, wie etwa Phosphatidylcholin, anionische Phospholipide, wie etwa Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylglycerin, Diphosphatidylglycerin (Cardiolipin), Phosphoinositol und veresterte Derivate davon, wie etwa Dimyristoylphosphatidylglycerin. Es können z.B. Phospholipide aus natürlichen Quellen, z.B. Ei- oder Sojalecithin, synthetische Phospholipide oder Kombinationen davon verwendet werden. Besonders bevorzugt enthält die Formulierung mindestens ein anionisches Phospholipid. Gute Ergebnisse wurden erhalten, wenn man eine Kombination von Phosphatidylcholin und

Dimyristoylphosphatidylglycerin in einem Gewichtsverhältnis von 70:30 verwendet.

5 Weiterhin kann die Formulierung vorzugsweise eine membranstabilisierende Komponente enthalten, wie etwa Cholesterin oder Derivate davon, in einem Gewichtsanteil von bis zu 5 %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung. Die Membranstabilität bzw. -rigidität kann aber auch durch Auswahl entsprechender Fettsäuren in den Phospholipiden oder
10 gegebenenfalls anderen Lipidkomponenten über die Kettenlänge oder/und den Grad der Unsättigung eingestellt werden.

Vorzugsweise enthält die Formulierung auch ein Gefrierschutzmittel, das günstigerweise in einem Gewichtsanteil von bis zu 15 %, vorzugsweise von 5-15 %, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung vorliegt.
15 Beispiele für geeignete Gefrierschutzmittel sind Kohlenhydrate, z.B. Mono-, Di- oder Trisaccharide, wie etwa Lactose, Saccharose, Trilactose, Maltose, Trehalose etc. oder/und Zuckeralkohole, wie etwa Sorbit, Mannit etc.

Die erfindungsgemäße liposomale Formulierung kann unilamellare
20 Liposomen, multilamellare Liposomen, ungeordnete Komplexe und Kombinationen davon enthalten. Bevorzugt sind Liposomen, bei denen der mittlere Durchmesser nach Herstellung nicht größer als 500 nm ist und insbesondere im Bereich von 100-250 nm liegt.

25 Die erfindungsgemäße liposomale Formulierung kann beispielsweise hergestellt werden durch Hochdruckhomogenisierung einer den Wirkstoff und die Lipide enthaltenden Suspension und gegebenenfalls anschließende Filtration. Andere Möglichkeiten sind dem Fachmann bekannt, z.B. Lösungsmittelinjektion, Hydratation von Lipidfilmen etc.

30

Die liposomale Formulierung kann sterilfiltriert und gegebenenfalls dehydratisiert werden, z.B. durch Lyophilisierung. Nach wässriger

Rekonstitution von dehydratisierten Liposomen kann sich der mittlere Durchmesser erhöhen, z.B. auf 100-1.000 nm.

Die erfindungsgemäße Formulierung wird kann zur parenteralen Applikation, z.B. zur intravenösen Injektion, zur Infusion oder zur subkutanen oder intramuskulären Injektion, eingesetzt werden. Die Tagesdosis ist vorzugsweise 5-250 mg, besonders bevorzugt von 20-120 mg bei subkutaner oder intramuskulärer Verabreichung und von 10-500 mg, besonders bevorzugt von 50-250 mg bei intravenöser Verabreichung, jeweils bezogen auf ein mittleres Körpergewicht von 70 kg. Die Verabreichung erfolgt vorzugsweise einmal täglich bis einmal wöchentlich.

Die erfindungsgemäße Formulierung kann gegebenenfalls in Kombination mit anderen Wirkstoffen, z.B. cytotoxischen Mitteln, eingesetzt werden. Die Verabreichung erfolgt vorzugsweise gemeinsam, z.B. als Vor- oder/und Nachbehandlung im Zusammenhang mit chirurgischen Eingriffen, Strahlenbehandlung oder/und Chemotherapie.

Weiterhin soll die Erfindung an den folgenden Beispielen näher erläutert werden.

Beispiel 1: Herstellung von liposomalen Präparationen

1.1 Materialien

Dimyristoylphosphatidylglycerin-Natriumsalz (DMPG-Na) wurde von Nippon Fine Chemicals bezogen. Ei-Phosphatidylcholin (EPC) wurde von Lipoid KG bezogen.

1.2 Herstellung von Liposomen mit pH 6,5

Die Phospholipide und der Wirkstoff $N\alpha$ -(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-3-amidino-(L)-phenylalanin-4-ethoxycarbonylpiperazid (WX-UK1) als Hydrochlorid wurden zusammen in 50 mmol/l Phosphatpuffer pH 6,5 und

9 % Lactose dispergiert. Anschließend wurde das Gemisch auf 40 °C erhitzt und für 30 min in ein Ultraschallbad gegeben.

5 Zur Hochdruckhomogenisierung wurde ein EmulsiFlex C5-Gerät von Avestin, ausgestattet mit einer Extrusionseinheit verwendet, so dass Homogenisierung und Hochdruckextrusion durch ein Polycarbonat-Membranfilter in Serie durchgeführt werden konnten.

10 Zunächst wurde die Liposomensuspension durch den Hochdruckhomogenisator für 6 min (entsprechend 20 Passagen) bei einem Druck von 345 bar geleitet. Dann wurde die Formulierung 6 min durch ein 100 nm Polycarbonat-Membranfilter in der Extrusionseinheit geleitet.

1.3 Herstellung von Liposomen mit pH 8,4

15 Liposomale Präparationen mit einem pH-Wert von 8,4 wurden auf ähnliche Weise erhalten. Zunächst wurde jedoch eine Dispersion mit einem pH-Wert von 5,2 hergestellt und einer Hochdruckhomogenisierung unterzogen. Danach wurde durch Zugabe von Dinatriumhydrogenphosphat der pH-Wert auf 8,4 eingestellt und eine weitere Homogenisierung für 6 min bei einem
20 Druck von 345 bar durchgeführt.

1.4 Sterilfiltration, Abfüllung und Lyophilisierung

Die liposomalen Formulierungen wurden durch ein sterilisiertes 450 nm Filter (Polyvinylidendifluorid-Durapore von Millipore) filtriert, die filtrierten
25 Suspensionen in 0,5 ml Aliquots abgefüllt und dann lyophilisiert.

1.5 Größenbestimmung

Zur Bestimmung der mittleren Größe und der Größenverteilung der liposomalen Suspensionen wurde ein Malvern Zetasizer 1000 verwendet.
30 Der Homogenitätsgrad der Suspensionen wurde als Polydispersitätsindex (PI) ausgedrückt. Ein Wert von 0,1 bedeutet eine sehr enge Größenverteilung und ein Wert von 0,9 eine sehr breite Verteilung.

1.6 Resultate

Die Zusammensetzungen und die Analysenergebnisse sind in der nachfolgenden **Tabelle 1** zusammengefasst. Nach Rekonstitution war der Wirkstoffgehalt der liposomalen Formulierung zwischen 18 und 21 mg/ml und die Teilchengröße zwischen 350 und 500 nm, wobei die Teilchengröße während der Lyophilisierung und Rekonstitution signifikant zunahm.

Liposomen, die Wirkstoff zusammen mit negativ geladenen Phospholipiden enthielten, konnten verdünnt werden, während neutrale Liposomen bei Zugabe von Puffer eine Präzipitation zeigten.

Tabelle 1

Komponenten	Konzentration (%)	Teilchengröße (nm) / PI		Tatsächliche Konzentration nach Rekonstitution (%)
		vor Rekonstitution	nach Rekonstitution	
Formulierung 1				
EPC pH 6,5				
WX-UK1.HCl	2,00	108/0,27	518/0,53	1,98
EPC	10,00			
Lactose	7,91			
Na ₂ HPO ₄ x 2H ₂ O	0,72			
Wasser	ad 100 %			
Formulierung 2				
PC/PG pH 6,5				
WX-UK1.HCl	2,00	307/0,49	405/0,45	2,05
EPC	7,00			
DMPG.Na	3,00			
Lactose	7,90			
Na ₂ HPO ₄ x 2H ₂ O	0,72			
Wasser	ad 100 %			
Formulierung 3				
EPC pH 8,4				
WX-UK1.HCl	2,00	269/0,24	359/0,34	1,80
EPC	10,00			
Lactose	9,70			
Na ₂ HPO ₄ x 2H ₂ O	0,70			
Wasser	ad 100 %			
Formulierung 4				
PC/PC pH 8,4				
WX-UK1.HCl	2,00	202/0,23	353/0,43	1,98
EPC	7,00			
DMPG.Na	3,00			
Lactose	9,70			
Na ₂ HPO ₄ x 2H ₂ O	0,40			
Wasser	ad 100 %			

Beispiel 2: Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit liposomaler Formulierungen in der Ratte

2.1 Applikation

5 Weibliche Wistar Ratten, 240-300 g Körpergewicht (Charles River-Wiga, Sulzfeld) wurden mit dem Wirkstoff WX-UK1 in Form einer wässrigen Lösung oder mit den in Beispiel 1 beschriebenen liposomalen Formulierungen 1-4 behandelt. Die Tiere erhielten über einen Zeitraum von 10 Tagen jeweils 1 Gabe/Tag. Die Applikationen erfolgten in den Bereich der Flanke (zwischen Schulter und hinteren Gliedmaßen), so dass die Tiere die Injektionsstelle nicht mit den Pfoten erreichen konnten. Die Injektionsstellen wurden in Abständen von ca. 1 cm gesetzt, es wurde nicht mehrmals in die gleiche Stelle injiziert. Die ersten fünf Injektionen erfolgen auf der linken Seite, die zweiten fünf Injektionen auf der rechten Seite. Die Dosis betrug in der Regel 3 mg Wirkstoff/kg Körpergewicht, d.h. bei einem mittleren Körpergewicht von 300 g wurden 0,9 mg Wirkstoff appliziert. In einigen Fällen wurde radioaktiv markierter Wirkstoff (^3H -WX-UK1) appliziert.

2.2 Beobachtung der Tiere

20 Die Tiere wurden vor jeder Injektion gewogen und nach jeder Injektion über 2 h beobachtet, vor jeder weiteren Injektion wurden die vorhergehenden Injektionsstellen palpiert. Das Verhalten der Tiere und der Palpationsbefund wurden protokolliert.

25 Zur Bewertung der beobachteten Beeinträchtigungen wurde folgender Score benutzt:

Verhalten der Tiere nach der Injektion (2 h)		
30	unauffällig	0
	leichtes Kratzen in 1. Stunde	1
	Kratzen und Anzeichen von Schmerz	2

- 19 -

nach 2 h noch deutliche Beeinträchtigung 3

Laufender Palpationsbefund

	unauffällig	0
5	leichte, vereinzelte Verdickungen/Verhärtungen	1
	leibende Verdickungen/Verhärtungen, zusammenfließend	2
	zusätzliche Läsionen, Entzündungen	3

2.3 Untersuchungen nach Beendigung der Applikation

10 24 h nach der letzten Injektion wurden die Tiere narkotisiert (Ethylurethan, 1,4 g/kg i.p.) und aus dem retroorbitalen Venenplexus Citrat-Blut gewonnen; Citrat-Plasma wurde durch Zentrifugation bei 1.200 xg für 10 min erhalten. Dann wurde der Gallengang präpariert und über 15 min Galle gewonnen. Anschließend wurden die Hautbereiche der Injektionsstellen
15 untersucht und bei der Präparation ein makroskopischer Befund erhoben.

Zur Bewertung der beobachteten makroskopischen Veränderungen wurde folgender Score benutzt:

20	Abschließende Beobachtungen, makroskopischer Befund bei Präparation	
	unauffällig	0
	vereinzelte Verhärtungen bzw. schwartige Herde	1
	zahlreiche schwartige Herde bzw. Knoten	2
	zahlreiche schwartige, entzündliche Herde bzw. Knoten	3

25

Von den Bereichen der Injektionen wurden Hautproben präpariert, in Formalin fixiert und histologisch untersucht (Hämatoxylin/Eosin-Färbung). Zur Bewertung der histologisch sichtbaren Veränderungen wurde folgender Score benutzt:

30

- 20 -

Histologischer Befund:

	unauffällig	0
	vereinzelte Nekrosen, vereinzelte entzündliche Reaktionen	1
5	Nekrosen oder entzündliche Reaktionen	2
	Nekrosen und starke entzündliche Reaktionen und/oder weitere Veränderungen	3

10 Anschließend wurden die Tiere getötet und verschiedene Organe (Herz, Niere, Leber, Milz) präpariert. In Plasma, Galle und den Organen wurde der Gehalt an Wirkstoff mittels HPLC [Standard-Methode mittels Nucleosil 7 C18 Säulen (Macherey-Nagel, Düren), Acetonitril/Wasser/Perchlorsäure 30/70/0,04, 1 ml/min] nach Vorreinigung mittels Chromabond C18 Festphasen-Extractionssäulen (Macherey-Nagel, Düren) bestimmt. Bei
15 Einsatz von ^3H -WX-UK1 wurde die Konzentration von Wirkstoff direkt nach Lyophilisation der Proben durch Messung der Radioaktivität in einem Flüssigkeits-Szintillationszähler bestimmt.

2.4 Ergebnisse

20 Als Kontrollen diente die Gabe von WX-UK1 gelöst in 0,5 ml NaCl (0,9 %) mit 5 % Ethanol (Versuche 628, 629)

25 Lyophilisierte neutrale Liposomen pH 6,5 (Formulierung 1) wurden mit Wasser resuspendiert und direkt eingesetzt. Entsprechend der dann enthaltenen Konzentration von 20 mg/ml wurden 45 μl pro Ratte (300 g Körpergewicht) appliziert, das entspricht der gewünschten Dosis von 3 mg/kg Körpergewicht (Versuche 624, 625).

30 Lyophilisierte negative Liposomen pH 6,5 (Formulierung 2) wurden mit Wasser resuspendiert. Entsprechend der dann erhaltenen Konzentration von 16 mg/ml wurden 55 μl pro Ratte (300 g Körpergewicht) appliziert, das

entspricht der gewünschten Dosis von 3 mg/kg Körpergewicht (Versuche 626, 627).

5 Lyophilisierte neutrale Liposomen pH 8,4 (Formulierung 3) wurden mit Wasser suspendiert und direkt eingesetzt. Entsprechend der dann enthaltenen Konzentration von 20 mg/ml wurden 45 µl pro Ratte (300 g Körpergewicht) appliziert, das entspricht der gewünschten Dosis von 3 mg/kg Körpergewicht (Versuche 632, 633).

10 Lyophilisierte negative Liposomen pH 8,4 (Formulierung 4) wurden mit Wasser suspendiert und direkt eingesetzt. Entsprechend der dann erhaltenen Konzentration von 20 mg/ml wurden 45 µl pro Ratte (300 g Körpergewicht) appliziert, das entspricht der gewünschten Dosis von 3 mg/kg Körpergewicht (Versuche 637, 638).

15 2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die **Tabelle 2** enthält die Konzentrationen von WX-UK1 in Plasma, Galle und den Organen Niere, Leber, Milz und Herz. Die Konzentration im Plasma ließ sich nur bei Einsatz von ³H-WX-UK1 bestimmen, sie liegt bei <100
20 ng/ml. Sehr vergleichbare Konzentrationen finden sich in den Kontrollen bei Applikationen in NaCl/Ethanol und Gabe der Liposomen 3 und 4. Bei den Liposomen 1 bzw. 2 wurden geringere Konzentrationen von WX-UK1 in Galle und Organen gefunden. Die Bewertung der histologischen Befunde ist in **Tabelle 2** zusammengestellt.

25 Die **Tabellen 3 und 4** enthalten die Bewertung der Applikationsfolgen in den Tieren. Es ist zu erkennen, dass die Verabreichung der liposomalen Formulierungen zu erheblich geringeren Nebenwirkungen als die Verabreichung der wässrigen Lösung führt.

- 22 -

In **Abbildung 1** (Vergrößerung 25fach) ist Haut nach der Applikation von WX-UK1, gelöst in den Liposomen 4, dargestellt. Es sind keine Veränderungen zu normaler Haut (**Abbildung 2**) zu erkennen.

- 5 **Abbildung 3** (Vergrößerung 25fach) zeigt den Befund nach Gabe von WX-UK1 in NaCl/Ethanol. Zwischen Subcutis II und den Muskelzellen ist eine starke entzündliche Randreaktion zu erkennen, die Subcutis II ist nekrotisch aufgetrieben.

Tabelle 2: Konzentration in Plasma, Galle und Organen nach s.c.-Gabe verschiedener Zubereitungen (n.n. = nicht bestimmt)

Vers.- Nr.	Gabe	Konzentration (µg/ml)		Organgehalt (µg/g)			
		Plasma	Galle	Niere	Leber	Milz	Herz
628	Kontrolle	<0,05	3,1	2,5	0,36	0,65	1,0
629	Kontrolle	<0,05	3,1	2,3	0,18	0,69	0,84
624	Liposomen 1	<0,05	2,7	1,9	0,18	0,46	0,31
625	Liposomen 1	<0,05	4,2	1,5	0,48	0,44	0,88
Mittelw.		<0,05	3,4	1,7	0,33	0,45	0,60
626	Liposomen 2	<0,05	1,6	0,66	0,23	0,23	0,31
627	Liposomen 2	<0,05	2,5	1,7	0,35	0,14	0,32
Mittelw.		<0,05	2,05	1,2	0,29	0,18	0,32
632	Liposomen 3	n.b.	7,2	4,12	0,90	0,40	1,74
633	Liposomen 3	n.b.	6,85	2,49	0,31	0,49	0,66
Mittelw.			7,0	,030	0,60	0,44	1,20
637	Liposomen 4	n.b.	6,78	2,92	0,36	0,38	1,09
638	Liposomen 4	n.b.	9,8	3,49	0,78	0,48	1,19
Mittelw.			8,3	3,20	0,57	0,43	1,50

Tabelle 3: Histologische Bewertung der untersuchten Hautareale

Nr.	Gabe	Score	Befund
628	Kontrolle	3	umschriebene Nekrosen mit entzündlicher Randreaktion (Leukozyten, beginnendes Granulationsgewebe)
629	Kontrolle	3	wie 629
MW = 3			
624	Lip. 1	0	ohne Befund/keine Histo
625	Lip. 1	1	nur 1 Herd: Nekrosen und ausgepr. Randrkt. (wie Kontr.)
MW = 0,5			
626	Lip. 2	1	2 kleine Herde: entzündliche Reaktionen
627	Lip. 2	0	normal, geringste entzündliche Infiltrationen
MW = 0,5			
632	Lip. 3	1	1 Herd: Nekrose mit erheblichen leukozytischen Randreaktion
633	Lip. 3	0	unauffällig
MW = 0,5			
637	Lip. 4	0,5	keine Nekrose, geringe bandförmige entzündliche Reaktion
638	Lip. 4	0,5	wie 637
MW = 0,5			

Beispiel 3: Verträglichkeit liposomaler Formulierungen im Kaninchen

16 männliche Himalaya-Kaninchen (LPT Labor der Pharmakologie und Toxikologie, Löhndorf) mit einem Körpergewicht zwischen 2,15 und 2,40 kg und einem Alter von etwa 3,5 Monaten wurden als Versuchstiere eingesetzt.

Die Wirkstoffformulierungen wurden subkutan verabreicht. Bei zwei Kaninchen erfolgte die Verabreichung im Bereich des Halses und bei weiteren zwei Kaninchen in die Flanke. Jedes Tier erhielt vier subkutane Injektionen pro Applikationstag in einem Intervall von 2 Tagen an den Untersuchungstagen 1, 3, 5 und 7. Das Volumen der verabreichten Formulierung war zwischen 0,41 und 0,5 ml/Applikation.

Es wurden die in Beispiel 1 beschriebenen liposomalen Formulierungen 1-4 verabreicht. Dabei wurden keinerlei lokale Unverträglichkeitsreaktionen gefunden. Es gab keine Anzeichen für Ödeme, Erytheme, nekrotische Veränderungen oder mechanische Veränderungen (Kratzen).

Auch morphologische Untersuchungen, beginnend 24 h nach der letzten der vier subkutanen Applikation für insgesamt 4 Tage zeigten keinerlei mit der Wirksubstanz assoziierten morphologischen Veränderungen.

Klinische Anzeichen von systemischer Toxizität wurden nicht gefunden. Das Fressverhalten der Kaninchen war unbeeinflusst. Dermatologische Untersuchungen zeigten keine Veränderungen der Parameter Thromboplastinzeit und aktivierte partielle Thromboplastinzeit.

- 27 -

Beispiel 4: Pharmakologische Wirksamkeit von liposomalen Formulierungen in der Ratte

Die pharmakologische Wirksamkeit der erfindungsgemäßen liposomalen Formulierungen wurde an weiblichen Ratten (Alter 7 Wochen, Gewicht 100-150 g) getestet.

Es wurden insgesamt 15 Ratten verwendet, die in 5 Gruppen (jeweils 3 Ratten/Gruppe) aufgeteilt wurden. Den Ratten wurden metastasierte Brustkarzinomzellen BN-472 (Kort et al., J. Natl. Cancer Inst. 72 (1984), 709-713) unter das Brust-Fettpolster implantiert. Am Tag 3 nach der Tumorinokulation wurde mit folgendem Behandlungsprotokoll begonnen:

- | | |
|----------|--|
| Gruppe A | Vehikelkontrolle, 1x/Tag s.c. |
| Gruppe B | wässrige Lösung des Wirkstoffs (0,3 mg/kg), 1x/Tag s.c. |
| Gruppe C | liposomale Formulierung 4 (PC/PG pH 8,4), 0,3 mg Wirkstoff/kg, 1x/Tag s.c. |
| Gruppe D | liposomale Formulierung 4 (PC/PG pH 8,4), 1,0 mg Wirkstoff/kg, 1x/Tag s.c. |
| Gruppe E | liposomale Formulierung 4 (PC/PG pH 8,4), 3,0 mg Wirkstoff/kg, 1x/Tag s.c. |

Es wurde das Auftreten von Tumorfoci in der Lunge, in den axillären Lymphknoten und in den intraperitonealen Lymphknoten sowie das Gewicht der Tumore bestimmt.

Die Ergebnisse sind in **Abbildung 4** dargestellt und zeigen, dass die liposomale Formulierung pharmakologisch wirksam ist.

Beispiel 5: Hämolysetest mit liposomalen Formulierungen

Es sollte geprüft werden, ob liposomale WX-UK1-Formulierungen in der Lage sind, hämolytische Eigenschaften des Wirkstoffs zu reduzieren. Der Hämolysetest wurde parallel mit verdünntem Vollblut und gewaschenen Erythrozyten jeweils im Doppelansatz durchgeführt.

1 ml Blut (stabilisiert mit Citrat) wurde mit 4 ml 0,9 %iger NaCl-Lösung verdünnt und in Aliquots von jeweils 200 μ l unterteilt. 1 ml der jeweils getesteten Wirkstofflösung (600, 240, 120, 60, 24, 12, 0 μ g/ml bezogen auf den Wirkstoffgehalt) wurden zu den 200 μ l Blut gegeben, vermischt und bei 37 °C inkubiert. Nach 30 min Inkubation wurde 5 min bei ca. 1.000 xg zentrifugiert. Die Überstände wurden abgenommen und der Hämolysegrad wurde visuell beurteilt.

Zum Hämolysetest an gewaschenen Erythrozyten wurde 1 ml Citrat-Blut mit 5 ml 0,9 %iger NaCl-Lösung mehrmals gewaschen und 0,4 ml der gewaschenen Erythrozyten mit 4,4 ml 0,9 %iger NaCl-Lösung vermischt. Die resultierende Mischung wurde in Aliquots zu jeweils 200 μ l aufgeteilt und ansonsten wie Vollblut behandelt.

Als liposomale Formulierungen wurden die Formulierungen 1 (EPC, pH 6,5) und 2 (PC/PG, pH 6,5) gemäß Beispiel 1 getestet. Lediglich bei der höchsten Konzentration (500 μ g) der Formulierung 1 wurde eine schwache Hämolyse im Vollblut festgestellt. Alle höheren Verdünnungen waren nicht hämolytisch. Die Formulierung 2 war bei keiner der getesteten Konzentrationen mit Vollblut bzw. gewaschenen Erythrozyten hämolytisch.

Im Vergleich nicht liposomalen Formulierungen wurde eine mindestens 10fache Verringerung der hämolytischen Wirkung für die Formulierung 1 eine noch erheblich höhere Verringerung für die Formulierung 2 gefunden.

**Beispiel 6: Bestimmung der Konzentration von freiem, nicht liposomal
komplexierten Wirkstoff WX-UK1 in liposomalen
Formulierungen**

5 Es wurden die Formulierungen 1-4 gemäß Beispiel 1 getestet.

60 μ l der Formulierung wurden durch eine Microcon YM-50 Filtereinheit
zentrifugiert und dann in einer HPLC auf den Gehalt an verbleibendem
Wirkstoff mithilfe einer Kalibrierungsgeraden untersucht.

10

Der Gehalt an freiem WX-UK1 in den entsprechenden Formulierungen
beträgt:

Formulierung 1 (EPC, pH 6,5):	550 μ g/ml
Formulierung 2 (PC/PG, pH 6,5):	42 μ g/ml
15 Formulierung 3 (EPC, pH 8,4):	461 μ g/ml
Formulierung 4 (PC/PG, pH 8,4):	39 μ g/ml

Ansprüche

1. Pharmazeutische liposomale Formulierung,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie als Wirkstoff ein als Urokinase-Inhibitor wirksames 3-Amidino- oder 3-Guanidino-phenylalanin-Derivat enthält.
2. Formulierung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Urokinase-Inhibitor ausgewählt ist aus $N\alpha$ -(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-3-amidino-(D,L)-phenylalanin-4-ethoxycarbonylpiperazid, dem L-Enantiomer davon oder einem pharmazeutisch verträglichen Salz dieser Verbindungen.
3. Formulierung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Urokinase-Inhibitor ausgewählt ist aus $N\alpha$ -(2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl)-3-guanidino-(D,L)-phenylalanin-4-ethoxycarbonylpiperazid, dem L-Enantiomer davon oder einem pharmazeutisch verträglichen Salz dieser Verbindungen.
4. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wirkstoff in einem Gewichtsanteil von 0,5-10 % bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung vorliegt.
5. Formulierung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wirkstoff in einem Gewichtsanteil von 2-5 % vorliegt.

6. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie einen pH-Wert im Bereich von 5,5-9,0 aufweist.
- 5 7. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie Phospholipide in einem Gewichtsanteil von 4,5-40 %
bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung enthält.
- 10 8. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie Phospholipide, ausgewählt aus neutralen Phospholipiden,
anionischen Phospholipiden und Kombinationen davon enthält.
- 15 9. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie mindestens ein anionisches Phospholipid, wie etwa
Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylglycerin,
Diphosphatidylglycerin, Phosphoinositol oder veresterte Derivate
20 davon enthält.
10. Formulierung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie Phosphatidylcholin und Dimyristoyl-phosphatidylglycerin in
25 einem Gewichtsverhältnis von 70:30 enthält.
11. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie weiterhin eine membranstabilisierende Komponente, wie
30 etwa Cholesterin, in einem Gewichtsanteil von bis zu 5 % bezogen
auf das Gesamtgewicht der Formulierung enthält.

12. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie weiterhin ein Gefrierschutzmittel enthält.
- 5 13. Formulierung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gefrierschutzmittel in einem Gewichtsanteil von bis zu
15 %, vorzugsweise 5-15 %, bezogen auf das Gesamtgewicht der
Formulierung vorliegt.
- 10 14. Formulierung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gefrierschutzmittel aus Kohlenhydraten oder/und
Zuckeralkoholen ausgewählt ist.
- 15 15. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mittlere Durchmesser der Liposomen nicht größer als 500
nm ist.
- 20 16. Formulierung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass der mittlere Durchmesser der Liposomen von 100-250 nm ist.
- 25 17. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Liposomen unilamellare Liposomen sind.
- 30 18. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 17 zur parenteralen
Applikation.
19. Formulierung nach Anspruch 18 zur intravenösen Injektion.

- 33 -

20. Formulierung nach Anspruch 18 zur Infusion.
21. Formulierung nach Anspruch 18 zur subkutanen Injektion.
- 5 22. Formulierung nach Anspruch 18 zur intramuskulären Injektion.
23. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 22 in dehydratisierter Form.
- 10 24. Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 23 zur Bekämpfung von Urokinase-assoziierten Erkrankungen.
25. Formulierung nach Anspruch 24 zur Tumorbekämpfung.
- 15 26. Formulierung nach Anspruch 25 zur Bekämpfung von Mammakarzinomen, Pankreaskarzinomen oder/und der Metastasenbildung.
27. Verwendung einer Formulierung nach einem der Ansprüche 1 bis 26
20 in Kombination mit cytostatischen Mitteln.

Abb. 1: Normale Haut





Abb. 2: Liposomen 203

Subcutis II



Muskelzellen



Subcutis I




Abb. 3: NaCl/Ethanol (5%)


Entzündung

Nekrose

Muskelzellen


Subcutis II

Subcutis I





-4/5-

Abb. 4a



-5/5-

Abb. 4b



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08011

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61K31/495 A61K9/127 A61P35/00 C07D295/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 00 04954 A (STUERZEBECKER JOERG ; LUTZ VERENA (DE); MAGDOLEN VIKTOR (DE); WILHE) 3 February 2000 (2000-02-03) page 14, line 26-30 claims	1, 2, 18-27
A	STURZEBECKER J ET AL: "3-Amidinophenylalanine-based Inhibitors of Urokinase" BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, OXFORD, GB, vol. 9, no. 21, 1 November 1999 (1999-11-01), pages 3147-3152, XP004181024 ISSN: 0960-894X the whole document	1-27



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

* & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 October 2003

Date of mailing of the international search report

06/11/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pacreu Largo, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No

PCT/EP 03/08011

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 199 40 389 A (WILEX BIOTECHNOLOGY GMBH) 1 March 2001 (2001-03-01) page 5, line 13-15 claims	1,3-27
A	WO 01 70204 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT ;STUERZEBECHER JOERG (DE); JACOB UWE (DE);) 27 September 2001 (2001-09-27) claims	1,3-27

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/08011

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0004954	A	03-02-2000	AT 230599 T	15-01-2003
			AU 754958 B2	28-11-2002
			AU 5161599 A	14-02-2000
			BR 9912327 A	02-05-2001
			CA 2338073 A1	03-02-2000
			DE 59903981 D1	13-02-2003
			WO 0004954 A2	03-02-2000
			EP 1264828 A1	11-12-2002
			EP 1098651 A2	16-05-2001
			ES 2189455 T3	01-07-2003
			JP 2002521348 T	16-07-2002
			US 2003013723 A1	16-01-2003
			US 6624169 B1	23-09-2003
DE 19940389	A	01-03-2001	DE 19940389 A1	01-03-2001
			AU 7903400 A	19-03-2001
			WO 0114324 A1	01-03-2001
			EP 1206447 A1	22-05-2002
WO 0170204	A	27-09-2001	DE 10013715 A1	27-09-2001
			AU 6379101 A	03-10-2001
			WO 0170204 A2	27-09-2001
			EP 1267854 A2	02-01-2003
			US 2003100584 A1	29-05-2003

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 A61K31/495 A61K9/127 A61P35/00 C07D295/18		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 A61K A61P		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CHEM ABS Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 00 04954 A (STUERZEBECHER JOERG ;LUTZ VERENA (DE); MAGDOLEN VIKTOR (DE); WILHE) 3. Februar 2000 (2000-02-03) Seite 14, Zeile 26-30 Ansprüche	1,2, 18-27
A	STURZEBECHER J ET AL: "3-Amidinophenylalanine-based Inhibitors of Urokinase" BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, OXFORD, GB, Bd. 9, Nr. 21, 1. November 1999 (1999-11-01), Seiten 3147-3152, XP004181024 ISSN: 0960-894X das ganze Dokument	1-27
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie </div> </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>*A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>*E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>*L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</p> <p>*O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>*P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</p> <p>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</p> <p>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist</p> <p>*Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p> </div> </div>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
30. Oktober 2003		06/11/2003
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Pacreu Largo, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 199 40 389 A (WILEX BIOTECHNOLOGY GMBH) 1. März 2001 (2001-03-01) Seite 5, Zeile 13-15 Ansprüche ---	1,3-27
A	WO 01 70204 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT ;STUERZEBECHER JOERG (DE); JACOB UWE (DE);) 27. September 2001 (2001-09-27) Ansprüche -----	1,3-27

INTERNATIONALER RESEARCHBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu derselben Patentfamilie gehören

Internat. Aktenzeichen

PCT/EP 03/08011

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0004954 A	03-02-2000	AT 230599 T	15-01-2003
		AU 754958 B2	28-11-2002
		AU 5161599 A	14-02-2000
		BR 9912327 A	02-05-2001
		CA 2338073 A1	03-02-2000
		DE 59903981 D1	13-02-2003
		WO 0004954 A2	03-02-2000
		EP 1264828 A1	11-12-2002
		EP 1098651 A2	16-05-2001
		ES 2189455 T3	01-07-2003
		JP 2002521348 T	16-07-2002
		US 2003013723 A1	16-01-2003
		US 6624169 B1	23-09-2003
DE 19940389 A	01-03-2001	DE 19940389 A1	01-03-2001
		AU 7903400 A	19-03-2001
		WO 0114324 A1	01-03-2001
		EP 1206447 A1	22-05-2002
WO 0170204 A	27-09-2001	DE 10013715 A1	27-09-2001
		AU 6379101 A	03-10-2001
		WO 0170204 A2	27-09-2001
		EP 1267854 A2	02-01-2003
		US 2003100584 A1	29-05-2003